

ДОСВІД ВИКОРИСТОВУВАННЯ НІФЕДИПІНУ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗАГРОЗИ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ

*Кунець В.В., лікар-інтерн
Науковий керівник - к.мед.н. В.Л. Ольховик
СумДУ, кафедра акушерства та гінекології*

Однією з важливих проблем сучасного акушерства є передчасні пологи, які супроводжуються високою перинатальною захворюваністю і смертністю, інвалідизацією дітей. Пошук нових ефективних методів лікування загрози передчасних пологів є актуальним.

Мета дослідження: оцінка ефективності вживання блокатора кальцієвих каналів ніфедіпіна в лікуванні загрози передчасних пологів.

Дослідження проводилося в КЗ СОР ОПЦ. Вибірка складала 30 пацієнток з діагнозом загроза передчасних пологів, з них 15 пацієнток в II триместрі вагітності і 15 пацієнток в III триместрі. Використовувалися клінічний метод, УЗД плоду, кардіотокографія, доплерометрія судин фетоплацентарного комплексу. В результаті дослідження було виявлено відсутність ефекту від вживання ніфедіпіна із збереженням клінічних симптомів у однієї пацієнтки в II триместрі вагітності (6,6%). Відмовились від вживання препарату у зв'язку з сильним головним болем і гіпотонією три пацієнтки в II триместрі вагітності (20%). Наявність протипоказань в інструкції по вживанню з'явилася причиною відмови двох пацієнток в II і III триместрі вагітності відповідно. Вживання ніфедіпіна на протязі двох тижнів у чотирьох пацієнток в III триместрі вагітності показало високу ефективність і хорошу переносимість, новонароджені народилися своєчасно і в задовільному стані. Таким чином, вживання ніфедіпіна в II триместрі вагітності показало низькі показники у зв'язку з побічними ефектами (головний біль, гіпотонія), в III триместрі вагітності виявлена висока ефективність і хороша переносимість препарату.